

Datos de Acceso Rápido



BINDERS O FAJAS DE PECHO/SENOS

**Descargo de responsabilidad: Para todas las diapositivas en esta serie, el texto original es en inglés y traducido por el PIP para esta crítica.*

BINDERS O FAJAS DE PECHO/SENOS



PRÁCTICA DAÑINA DE



constreñir los senos para
imitar el pecho masculino



Estrategias promovidas por activistas de género:



Vendajes
elásticos



Binders o fajas
de pecho



Cinta adhesiva
o envoltura de
plástico



BINDERS O FAJAS DE PECHO/SENOS

Efectos adversos para la salud del binding o fajado de pecho



Dolor en el pecho



Mala postura



Cambios en las costillas/columna vertebral



Dolor de hombros



Fracturas de costilla



Dificultad para respirar



Mareos



Dolor de espalda

BINDERS O FAJAS DE PECHO/SENOS

Las organizaciones que promovían el
vendaje de los senos a través de
"roperos/closets de afirmación de género":



Escuelas



Bibliotecas



Hospitales




Organizaciones
LGBTQ




BINDERS O FAJAS DE PECHO/SENOS

Una encuesta mostró que el **68%** de las mujeres que usaban fajas "**estaban preocupadas por los efectos en la salud de las encuadernaciones**".



BINDERS O FAJAS DE PECHO/SENOS

Los síntomas incluyen:



BINDERS O FAJAS DE PECHO/SENOS


El dolor producido por el binding o fajado de pecho ocurre de **inmediato y empeora con el tiempo**, "alcanzando su punto máximo a los

5

años de atadura”.


BINDERS O FAJAS DE PECHO/SENOS

En un estudio, se concluyeron los siguientes resultados:



Fuente: Chest Binding and Care Seeking Among Transmasculine Adults: A Cross-Sectional Study (2018)

BINDERS O FAJAS DE PECHO/SENOS



“reportó al menos uno de los **28 resultados negativos** atribuidos al binding o fajado de pecho”.