


Datos de Acceso Rápido



COMORBILIDAD

**Descargo de responsabilidad: Para todas las diapositivas en esta serie, el texto original es en inglés y traducido por el PIP para esta crítica.*

COMORBILIDAD



"de los niños y jóvenes atendidos en Servicios de Desarrollo de la Identidad de género [Clínica de género de Reino Unido] cuyos padres completaron la escala de respuesta social (SRS) obtuvieron puntajes en **el rango leve a severo** de comportamiento autista".

Fuente: [Stats for Gender, 'Taking the lid off the box': The value of extended clinical assessment for adolescents presenting with gender identity difficulties \(2019\)](#)

COMORBILIDAD

Se descubrió que alrededor del

A large semi-circular graphic, resembling a thick arch or a stylized 'D' shape, is centered on the page. It is composed of two shades of gold or tan. The outer, larger portion is a lighter shade, while the inner, smaller portion on the left side is a darker shade. In the center of this arch, the text '15%' is displayed in a large, bold, dark blue font.

15%

de los jóvenes que se identifican como trans
tienen trastornos por **déficit de atención.**

COMORBILIDAD

“Los participantes con TDAH tenían

6.64

veces más probabilidades de
expresar una variante de género
que los participantes **sin** TDAH”.

COMORBILIDAD

40-45%

de los adolescentes que se identifican como trans **"tienen algún tipo de comorbilidad psiquiátrica"** que incluye:



depresión



autolesiones



ansiedad



intento de suicidio

Fuente: A 2020 Review of Mental Health Comorbidity in Gender Dysphoric and Gender Non-Conforming People (2021)

COMORBILIDAD

Los niños diagnosticados con disforia de género mostraban **una alta tasa de pérdida no resueltas por traumas** debido a



un comportamiento
inestable




conflictos
familiares y acoso




problemas con
los compañeros

COMORBILIDAD



de los niños que expresaron preocupaciones relacionadas con la identidad tenían **diagnósticos psiquiátricos comórbidos..**

COMORBILIDAD



de los adolescentes que solicitaron la "reassegnación médica de sexo" en Finlandia **recibieron tratamiento psiquiátrico** por razones **distintas** a la disforia de género.

Fuente: Two years of gender identity service for minors: overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development (2015)

COMORBILIDAD

Las condiciones comórbidas en el **75%** de los adolescentes que solicitan "reasignación médica de sexo" en Finlandia incluyen:

75%

50%

25%

