

Datos de Acceso Rápido



SUICIDIO

**Descargo de responsabilidad: Para todas las diapositivas en esta serie, el texto original es en inglés y traducido por el PIP para esta crítica.*

SUICIDIO

Los padres y las personas que detransicionan informan que la **amenaza de suicidio** se utilizó para manipularlos para que "consintieran" a los tratamientos de "atención de afirmación de género".

“

"El especialista en género al que me llevaron a ver les dije a mis padres que necesitaba que me recetaran medicamentos bloqueadores de la pubertad de inmediato. Le hicieron a mis padres una pregunta sencilla: "¿Preferirías tener una hija muerta o un hijo transgénero vivo?"

La elección fue suficiente para que mis padres bajaran la guardia y, en retrospectiva, no puedo culparlos. Este fue el momento en que todos nos convertimos en víctimas de la llamada 'cuidado que afirma el género'".



—CHLOE COLE

”

SUICIDIO

Incluso los **médicos de género admiten...**

"Hasta donde yo sé, no hay estudios que digan que si no empezamos a darle hormonas a estos niños inmediatamente cuando dicen que las quieren, se van a suicidar. Así que esa alegación está equivocada".



SUICIDIO

Un estudio finlandés demostró que


"los problemas de salud mental concurrentes, en lugar de la disforia de género, son los principales predictores de todas las causas de mortalidad y las causas relacionadas al suicidio en los adolescentes que buscan el cuidado que afirma el género."



-STATS FOR GENDER ON SUICIDE



SUICIDIO



de los niños que expresaron preocupaciones relacionados con la identidad tenían **diagnósticos psiquiátricos comórbidos.**

SUICIDIO

La **tasa de suicidio** de los pacientes de los servicios de desarrollo de la identidad de género (GIDS - Clínica de género de Reino Unido), fue

5.5 **x** veces mayor

en comparación con la población del Reino Unido de edad **y composición sexual similares.**



Los pacientes que se identifican como transgénero siguen **en riesgo de suicidio a pesar de los tratamientos de "atención de afirmación de género."**

SUICIDIO

Los hombres y mujeres con antecedentes de intervención quirúrgica tenían...

4.9x

Y

19.1x


“veces más probabilidades de haber hecho un intento de suicidio”



veces más probabilidades de haber muerto por suicidio, después de ajustar la comorbilidad psiquiátrica previa”.

SUICIDIO

En un estudio de 12 meses de 621,189 adolescentes que se autorreportaron al mismo, la tasa de ideación suicida "fue casi el doble" en los adolescentes que se identificaban como trans".



Los adolescentes que se identifican como **transgénero continuaron experimentando ideas suicidas.**

SUICIDIO

En comparación con la **población general**, las personas identificadas como transgénero tenían entre

7-8x  **3.5x**

veces más probabilidades de intentar suicidarse


veces más probabilidades de morir por suicidio

2x

 veces más probabilidades de morir por causas no relacionadas con el suicidio. 

SUICIDIO

En los hombres que se identifican como mujeres, "hubo una mortalidad total de



más alta que en la población general, principalmente por el aumento de las tasas de mortalidad por suicidio, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedad cardiovascular, abuso de drogas y otras causas desconocidas".

SUICIDIO

Un estudio sueco siguió a "personas a quienes se le había reasignado el sexo" durante un seguimiento a largo plazo (30 años) para descubrir que la tasa de suicidio era


19x



veces mayor que la de los controles del mismo sexo.

SUICIDIO

Un estudio de Nueva Zelanda muestra que...



5x veces más estudiantes que se identifican como trans informaron haber **intentado suicidarse** en los últimos 12 meses.



Incluso después de identificarse como transgénero, **los adolescentes eran más propensos a intentar suicidarse.**